

03.11.2023

**Толтразурил, розчин пероральний 2,5 %
(розчин для перорального застосування)
листівка-вкладка**

Опис

Прозора, від безбарвного або світло-жовтого до жовтого або жовто-коричневого кольору рідини.

Склад

1 мл препарату містить діючу речовину:

толтразурил - 25 мг.

Допоміжні речовини: триетаноламін, поліетиленгліколь 200.

Фармакологічні властивості

ATCvet QP51A, антипротозойні ветеринарні препарати (QP51AJ01, толтразурил).

4.1 Фармакодинаміка

Толтразурил, розчин пероральний 2,5 %, містить діючу речовину толтразурил-синтетичну речовину, що належить до групи триазинтріону з високим ступенем антиемерійної дії. Толтразурил порушує внутрішньоклітинні стадії розвитку еймерій, впливаючи на меронти, мерозоїти, мікро- та макрогамети. Толтразурил блокує дихальні ферменти і діє згубно на мітохондрії і процеси поділу ядра еймерій, порушуючи процес формування макрогаметоцитів, викликає загибель паразита.

4.2 Фармакокінетика

Після перорального введення препарату, толтразурил повільно всмоктується в організмі птиці. Рівень біодоступності до 50 %. Виводиться препарат з послідом переважно в незміненому вигляді (70 %) та у вигляді метаболітів (сульфонів). Найбільш високі концентрації його виявляються в печінці та нирках.

Застосування

Профілактика та лікування еймеріозу птиці (молодняк курей та індиків) спричинюваних:

- у курчат-бройлерів та ремонтного молодняка, віком до 90 діб, видами: *Eimeria acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. mitis*, *E. necatrix*, *E. tenella*;
- у індиків віком до 90 діб – *E. adenoides*, *E. meleagridis*, *E. meleagrimitis*.

Дозування

Толтразурил, розчин пероральний 2,5 %, перед застосуванням ретельно змішують з питною водою, у розрахунку: 1 мл препарату на 1 л питної води (25 мг толтразурилу на 1 кг маси тіла на добу) та випоюють птиці впродовж 2 діб або 3 мл препарату на 1 л води (75 мг толтразурилу на 1 кг маси тіла на добу) при випоюванні впродовж 8 годин на добу. Приготований розчин необхідно використати протягом 24-х годин.

Протипоказання

Гіперчутливість до толтразурилу.

Застереження

Забій птиці на м'ясо дозволяється через 16 діб після останнього застосування препарату. Отримане до зазначеного терміну м'ясо утилізують.

Форма випуску

Полімерні флакони/банки по 1000 мл у комплекті з кришкою з контролем першого відкриття.

Зберігання

У захищеному від світла місці, окремо від харчових продуктів та кормів, при температурі не вище 25 °С. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Термін придатності

5 років, після першого відкриття – 3 місяці.

Для застосування у ветеринарній медицині!

03. 1 1. 2023

Власник реєстраційного посвідчення

ПАТ НВЦ «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ»

Україна, 03134, м. Київ, вул. Миру, 17

Виробник готового продукту

ПАТ НВЦ «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ»

Україна, 03134, м. Київ, вул. Миру, 17